

定期予防接種スケジュール

名前 _____
 生年月日 _____

標準的な接種期間 接種可能な期間

・「〇か月」の下に月齢ごとの日付を書いておきましょう。
 ・実際に接種した日を記録しておきましょう。

記入例 7月10日生まれの場合

2 か 月
(9/10)
①
9/15

ワクチン名		0 か 月	1 か 月	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	12 か 月	1 1 か 歳 月	2 か 歳 月	3 か 歳 月	4 か 歳 月	5 か 歳 月	6 か 歳 月	1 1 か 歳 月	2 か 歳 月	1 1 か 歳 月	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳 以上
不活化	小児用肺炎球菌	(/)	(/)	①	②	③								④																	
不活化	B型肝炎			①	②				③																						
経口生	ロタウイルス			①	②	③																									
不活化	五種混合			①	②	③										④															
注射生	結核 (BCG)							①																							
注射生	麻疹風しん混合															①															
注射生	水痘													①								②									
不活化	日本脳炎																						①	②	③						
不活化	子宮頸がんワクチン																														①②③

二種混合：
小学6年生で

麻疹風しん
混合2期：
小学校就学前
の1年間
(年長児相当)


子宮頸がんワクチン：小学6年生～高校1年生相当の女子

●同じ予防接種との標準的な接種間隔・回数

小児用肺炎球菌※1	初回接種	27日以上の間隔を置いて3回
	追加接種	生後12か月以降かつ初回接種終了後、60日以上の間隔を置いて1回
B型肝炎	2回目	1回目から27日以上の間隔を置いて1回
	3回目	1回目から140日以上、2回目から6日以上の間隔を置いて1回
	種類	ロタリックス 27日以上の間隔を置いて2回 ロタテック 27日以上の間隔を置いて3回
五種混合	初回接種	20日以上の間隔を置いて3回
	追加接種	初回接種終了後、6～18か月までの間隔を置いて2回
水痘	1回目	生後12～15月に達するまでの期間に1回
	2回目	1回目終了後、6～12か月までの間隔を置いて1回
日本脳炎	1期初回	6日以上の間隔を置いて2回
	1期追加	1期初回(2回目)から概ね1年後に1回
子宮頸がんワクチン	2～3回※2	※3

※1 小児用肺炎球菌は、生後2か月から7か月に至るまでに接種を開始した場合の接種間隔・回数です。
 ※2 子宮頸がんワクチン(女子のみ)は、接種ワクチンや接種年齢によって接種間隔・回数が異なります。
 ◆法律等により、予防接種の内容に変更が生じる可能性があります。

●異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔



経口生ワクチン
・ロタウイルス

不活化ワクチン
・B型肝炎 ・日本脳炎
・二種混合 ・子宮頸がん
・五種混合
・小児用肺炎球菌
・インフルエンザ など

注射生ワクチンの
予防接種が受けられ
ます

経口生・不活化ワクチ
ンの予防接種が受けら
れ

他の予防接種
が

<小野市HPQRコード



各ワクチンの詳細は冊子「予防接種と子どもの健康」でご確認ください